

## اختبارات الدم للكشف عن أجسام IgG المضادة

للمرضى الذين تلقوا اللقاح ضد SARS-CoV-2 (كوفيد - 19)



تقدم جميع المراكز التابعة للمركز الإيطالي للسيطرة على الأمراض (CDC) اختبار الدم للكشف عن أجسام IgG المضادة التي يتم إنتاجها لمقاومة بروتين السنبل (Spike) (وهو الأنتيجين (المستضد) الفيروسي المحفز لاستجابة الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح من خلال إنتاج الأجسام المضادة المحيطة للفيروس).  
يحلل الاختبار الاستجابة المناعية لدى المرضى الذين تعرضوا لفيروس SARS-CoV-2 أو الذين تلقوا اللقاح الواقى من هذا الفيروس، وذلك للكشف عن وجود أجسام IgG المضادة لفيروس SARS-CoV-2 المحيطة لأثره والتحقق من استمرارية أثرها. يُنصح بإجراء اختبار الدم المخصص للكشف عن أجسام IgG المضادة التي يتم إنتاجها لمقاومة بروتين "السنبل" بعد مرور سبعة أيام على الأقل بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، لملاحظة تطور المقاومة ضد فيروس SARS-CoV-2.

السعر المعروض خلال شهر  
مارس (آذار)

29 يورو

اختبار الدم للكشف عن أجسام IgG المضادة  
المقاومة لبروتين "السنبل"

يجب الاتصال بالطبيب العام إذا كانت النتائج خارج النطاق المقبول