



El tema del Mes Laboratorio: Prueba Serológica IgG

PRUEBA SEROLÓGICA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IGG

PARA PACIENTES VACUNADOS CONTRA EL SARS-COV-2 (COVID-19)



En las sedes del CDC es posible realizar una prueba serológica de detección de anticuerpos IgG producidos contra la proteína Spike (antígeno viral que estimula la respuesta de anticuerpos en la persona vacunada a través de la producción de anticuerpos neutralizantes). La prueba analiza la respuesta inmunitaria de los pacientes que hayan contraído el Virus SARS-CoV-2 o que hayan recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2, detectando la presencia y, después, comprobando la permanencia de los anticuerpos IgG neutralizantes contra el virus SARS-CoV-2.

Se recomienda efectuar la prueba serológica de detección de anticuerpos IgG contra la proteína Spike al menos 7 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna a fin de comprobar si se ha desarrollado la protección contra el virus SARS-CoV-2.

**PRUEBA SEROLÓGICA PARA LA DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS IgG CONTRA LA PROTEÍNA SPIKE**

**PRECIO DEL MES
DE MARZO**

*En caso de encontrarse valores alterados, consulte a su
médico de cabecera*

29€